

مخاطر الحمل

• يجب عدم تناول الأيزوتريتينوين أثناء الحمل أو إذا كنتِ تخططين للحمل.
• يمكن أن يؤدي التعرض للأيزوتريتينوين إلى إلحاق ضرر بالغ بالجنين.

• يجب عليكِ تجنب حدوث حمل في الشهر الذي يسبق بدء العلاج بالأيزوتريتينوين، وأثناء تناوله، ولمدة شهر واحد بعد إيقاف العلاج.

• إذا كنتِ في سن الإنجاب، يجب عليكِ استخدام وسيلة فعالة لمنع الحمل خلال هذه الفترة. استشيرى الطبيب المعالج للتأكد من استخدامكِ للنوع الصحيح من وسائل منع الحمل.

• في حالة ممارسة علاقة زوجية غير محمية، يجب عليكِ الحصول على وسيلة منع حمل طارئة (حبوب منع الحمل الطارئة أو

تركيب جهاز داخل الرحم - اللولب IUD في أسرع وقت ممكن. يجب تناول الحبوب خلال 3 إلى 5 أيام من العلاقة غير المحمية، أما اللولب فيمكن تركيبه خلال مدة تصل إلى 5 أيام بعد العلاقة غير المحمية أو حتى 5 أيام من أقرب وقت محتمل للتبويض.

• إذا انقطعت الدورة الشهرية، أو حدث حمل، أو اعتقدتِ أنكِ حامل، توقي عن تناول الأيزوتريتينوين فوراً، واتصلي بفريق الأمراض الجلدية المتابع لكِ واطلبي المشورة الطبية. ينطبق هذا أثناء العلاج بالأيزوتريتينوين ولمدة شهر واحد بعد التوقف.

• إذا كان هناك أي احتمال لحدوث حمل، يجب عليكِ إجراء اختبارات حمل دورية وفقاً لتعليمات فريق الأمراض الجلدية.

بطاقة تذكير المريض:
سبتمبر 2026

بطاقة تذكير المريض لدواء ايزوتريتام (أيزوتريتينوين)

لقد سُلمت لكِ هذه البطاقة لأنكِ تتناولين دواء ايزوتريتام (أيزوتريتينوين) وتحتاجين لمعرفة الآثار الجانبية المحتملة



ادارة البيقظة الدوائية للصناعات الدوائية بشركة ميدزين
للصناعات الدوائية - العنوان : 426 طريق الحرية ،
رشدي ، الإسكندرية

هاتف: 01225659000 / 5410722-03

البريد الإلكتروني: medizen.pv@gmail.com

نموذج الشركة الإلكتروني:

<https://forms.gle/RBtKj5SWruxwRZwdA>

يرجى قراءة هذه البطاقة وشرة
معلومات المريض بدقة قبل بدء العلاج
بالأيزوتريتينوين للتأكد من فهمك
لمجموعة الآثار الجانبية المرتبطة
بتناوله. يرجى الرجوع إلى شرة معلومات
المريض (PIL) الخاصة بدواء ايزوتريتام
(بالأيزوتريتينوين) لمزيد من معلومات،
والمتاحة على:

www.edaegypt.gov.eg أو من
المعلومات المتوفرة في عبوة المنتج.

بيانات الاتصال (أسماء ورقم فريق الأمراض
الجلدية)

انظر الصفحة التالية للحصول على نصائح
بشأن التواصل مع خدمات الصحة النفسية

تنبيهات هامة للمرضى

- لا تشارك هذا الدواء مع أي شخص. يجب إعادة
أي كبسولات غير مستخدمة إلى الصيدلية.
- يجب عليكِ حضور مواعيد العيادة أثناء فترة
العلاج للمراقبة والرعاية المنتظمة.

- الصحة النفسية: تحدثي إلى فريق الأمراض
الجلدية أو الممارس العام حول علاجك أو إذا
كانت لديك أي مخاوف.
- يجب عليكِ التوقف عن تناول الإيزوتريتينوين
والإتصال بفريق الأمراض الجلدية أو طبيبك
للحصول على مزيد من النصائح إذا كانت لديك
مخاوف جدية بشأن صحتك النفسية أو أفكار
حول إيذاء نفسك أو في حال ظهور أي آثار
جانبية خطيرة أخرى .

- من المهم الإبلاغ عن ردود الفعل السلبية
المشتبه بها بعد الترخيص بالمنتج الدوائي.
يسمح بالمراقبة المستمرة لتوازن مخاطر
الفوائد للمنتج الطبي.

- تذكر أنه يجب إبلاغ الادارة العامة لليقظة
الصيدلانية بأي أحداث سلبية مشتبه بها.

- تُذكر الادارة العامة لليقظة الصيدلانية مقدمي
الرعاية الصحية والجمهور بالإبلاغ عن أي
معلومات تتعلق بالسلامة المتعلقة
بالمنتجات الطبية البشرية بما في ذلك
التفاعلات الدوائية الضارة والأخطاء الدوائية
ونقص الفعالية وغيرها من المشاكل المتعلقة
بالأدوية من خلال جهات الاتصال التالية:

الاسم: الإدارة العامة لليقظة الصيدلانية
العنوان: 21 شارع عبد العزيز آل سعود، المنيل، القاهرة،
مصر. صندوق بريد 11451
الهاتف : (+2) 02 25354100، تحويلة: 1470
الفاكس: +202-23610497

البريد الإلكتروني: pv.followup@edaegypt.gov.eg
إعداد التقارير عبر الإنترنت: [https://vigiflow-](https://vigiflow-forms.who-umc.org/eg/med)
[forms.who-umc.org/eg/med](https://vigiflow-forms.who-umc.org/eg/med)



إذا أحققتِ ضرراً بالغاً بنفسكِ أو تعتقدين أنكِ قد
تفعلين ذلك، اتصلي بالرقم 16328 او عبر
<https://mentalhealth.mohip.gov.eg>
يجب عدم التبرع بالدم أثناء العلاج بهذا الدواء
ولمدة شهر واحد بعد التوقف.

إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن تناول
الإيزوتريتينوين، فتحدث إلى فريق الأمراض الجلدية
أو الطبيب العام.