ماذا يجب أن أعرف عن الثورموكسيبان؟

♦ يقلل الثورموكسيبان من لزوجة الدم، وذلك يمنعك من الإصابة بجلطات دموية خطيرة.

♦ يجب تناول الثورموكسيبان كما هو محدد بالضبط من قبل الطبيب. وذلك لضمان الحماية الكاملة من جلطات الدم، **احرص على تناوله بانتظام دون السهو عن أي جرعة.**

♦ يجب عدم التوقف عن تناول الثورموكسيبان قبل التحدث إلى الطبيب أولا وذلك لأن خطورة إصابتك بجلطات الدم قد تزيد.

♦ اخبر الطبيب عن أي أدوية أخرى تتناولها حاليا، أو تناولتها قريبا، أو تنوي تناولها، وذلك قبل أن تبدأ في تناول الثورموكسيبان.

♦ اخبر الطبيب إنك تتناول الثورموكسيبان قبل أي عملية جراحية أو إجراء تدخلي.

متى يجب أن اطلب المشورة من الطبيب؟

عند تناول دواء يقلل من لزوجة الدم مثل الثورموكسيبان فمن المهم أن تعي آثاره الجانبية. يعد النزيف أشهر أثر جانبي. لا تبدأ في تناول الثورموكسيبان إن كنت تعلم أنك معرض لخطورة النزيف، قبل أن تناقش ذلك مع طبيبك.

اخبر الطبيب فورا إن كنت تعاني أي من أعراض أو علامات النزيف مثل الآتي:

♦ ألم

♦ تورم أو إحساس بعدم الراحة

♦ صداع أو دوخة أو وهن

♦ التعرض للكدمات المتكررة وغير المفسرة والنزف من الأنف ومن اللثة وبطئ التوقف من الجروح.

♦ تدفق الحيض أو نزيف مهبلي أكثر من المعتاد

♦ وجود دم في البول قد يكون وردي أو بني أو أحمر أو براز أسود.

♦ وجود دم في السعال أو القئ أو مواد تشبه القهوة المطحونة.

كيف اتناول الثورموكسيبان؟

♦ لضمان الحماية الكاملة، ثورموكسيبان

- يُمكن تناول 2.5 مجم مع أو بدون طعام.
- يُمكن تناول 10 مجم مع أو بدون طعام.
- يجب تناول 15 مجم مع الطعام.
- يجب تناول 20 مجم مع الطعام.

بطاقة تنبيه المريض

☐ ثورموكسيبان® 2.5 مجم

☐ ثورموكسيبان® 10 مجم

☐ ثورموكسيبان® 15 مجم

☐ ثورموكسيبان® 20 مجم

♦احتفظ بهذه البطاقة معك في جميع الأوقات.

♦قدم هذه البطاقة لأي طبيب بشري أو طبيب أسنان قبل البدء في العلاج.

Medizen
Pharmaceutical Industries

May 2023

أنا أخضع للعلاج بدواء مضاد لتجلط الدم - الثورموكسيبان (ريفاروكسابان)

الاسم: _____

الأدوية / الحالات المرضية الأخرى:

_____

العنوان:

_____

تاريخ الميلاد: _____

الوزن: _____

في حالة الطوارئ، يرجى إبلاغ:

اسم الطبيب:

_____

هاتف الطبيب:

_____

ختم الطبيب:

_____

يرجى أيضًا إخطار:

الاسم:

_____

الهاتف:

_____

صلة القرابة:

_____

معلومات خاصة بالأطباء:

- يجب عدم استخدام قيم اختبار النسبة المعياريّة الدولية (INR) لأنها ليست قياسا يُمكن الاعتماد عليه لمعرفة نشاط الثورموكسيبان المضاد لتجلط الدم.

Medizen
Pharmaceutical Industries

May 2023

بيانات الإبلاغ عن أي آثار جانبية:
يذكر مركز اليقظة الصيدلية المصري الجمهور بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالسلامة بالمنتجات الطبية البشرية بما في ذلك التفاعلات الدوائية الضارة والأخطاء الدوائية وقلة الفعالية والمشكلات الأخرى المتعلقة بالأدوية من خلال جهات الاتصال التالية:
مركز اليقظة الصيدلية المصري(EPVC)، الإدارة المركزية للشئون الصيدلية (CAPA)

العنوان: 21 شارع عبدالعزيز آل سعود، المنيل، القاهرة
صندوق بريد: 11451
هاتف: 25354100 02(2+)، رقم التحويل الداخلي: 1470
فاكس: 23610497 – 202+
بريد إليكتروني: pv.followup@edaegypt.gov.eg
الموقع الالكتروني للأبلاغ: www.edaeeypt.gov.eg
الخط الساخن: 15301
رمز الاستجابة السريع:

(For Physicians) QR code:

(For Patients) QR code:

Medizen
Pharmaceutical Industries

May 2023

و/أو

ميدزين للصناعات الدوائية- إدارة اليقظة الدوائية
العنوان: 426 طريق الحرية، رشدي، الإسكندرية
هاتف: 01225659000 / 03-5448585
بريد إليكتروني:medizen.pv@gmail.com

Medizen
Pharmaceutical Industries